JOURNAL
DE
MATHÉMATIQUES
PURES ET APPLIQUÉES
FONDÉ EN 1836 ET PUBLIÉ JUSQU'EN 1874
PAR JOSEPH LIOUVILLE

SIGISMOND GUNTHER

Résolution de l'équation indéterminée $y^2 + ax^2 = bz$ en nombres entiers

Journal de mathématiques pures et appliquées 3^e série, tome 2 (1876), p. 331-341.
<http://www.numdam.org/item?id=JMPA_1876_3_2__331_0>

gallica NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme Gallica de la Bibliothèque nationale de France
http://gallica.bnf.fr/

et catalogué par Mathdoc dans le cadre du pôle associé BnF/Mathdoc
http://www.numdam.org/journals/JMPA

Résolution de l'équation indéterminée $y^2 - ax^2 = bz$ *en nombres entiers;*

PAR M. SIGISMOND GUNTHER,

Privat-docent à l'École Polytechnique de Munich.

La méthode ordinaire pour la résolution des équations indéterminées du second degré prend pour base le développement connu d'une expression irrationnelle x en fraction continue

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \ddots + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_1 + x}}}},$$

Mais on sait qu'il y a aussi un autre procédé qui conduit au même but, si l'on pose avec Cataldi

$$\sqrt{a^2 + n} = a + \cfrac{n}{2a + \cfrac{n}{2a + \ddots}}.$$

Nous proposons d'étudier les propriétés de cette forme plus simple qui s'appliquent à la solution de la congruence

$$y^2 \equiv ax^2 \pmod{b}. \tag{1}$$

1. Considérons la fraction continue

$$K = \cfrac{a}{2u - \cfrac{a}{2u - \cfrac{a}{2u - \ddots}}}.$$

et désignons par Q_i le dénominateur de la $i^{ième}$ fraction réduite de K. On a la relation assez connue [*]

$$Q_{2n} = \begin{vmatrix} 2u & \sqrt{a} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{a} & 2u & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2u & \sqrt{a} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & 2u_{(2n)} \end{vmatrix}$$

où l'indice du terme $2u$ indique seulement l'ordre du déterminant. Additionnant à la $q^{ième}$ série horizontale $(q \leq n)$ la $(2n - q + 1)^{ième}$, on obtient

$$Q_{2n} = \left|\begin{array}{cccccc:cccccc} 2u & \sqrt{a} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & 2u \\ \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} \\ 0 & \sqrt{a} & 2u & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2u & \sqrt{a} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2u & \sqrt{a} & \sqrt{a} & 2u & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{a} & 2u_{(n)}+\sqrt{a} & 2u+\sqrt{a} & \sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \sqrt{a} & 2u & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2u & \sqrt{a} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & 2u_{(2n)} \end{array}\right|$$

Si maintenant on soustrait de chaque $q^{ième}$ colonne $(q \leq n)$ la

[*] *Voir*, par exemple, GUNTHER, *Lehrbuch der Determinantentheorie*; Erlangen, 1875, p. 157.

$(2n-q+1)^{ième}$, on trouvera, d'après le théorème de Laplace,

$$Q_{2n}=-\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & \sqrt{a}-2u \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\sqrt{a} & -2u & -\sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -2u & -\sqrt{a} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & -\sqrt{a} & -2u & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -\sqrt{a} & -2u & -\sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -2u & -\sqrt{a} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sqrt{a} & 2u \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2u & \sqrt{a} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \sqrt{a} & 2u & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{a} & 2u & \sqrt{a} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 2u+\sqrt{a} & \sqrt{a} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

et, par décomposition,

$$\begin{aligned} Q_{2n} &= \left[(2u-\sqrt{a})\,Q_{n-1} - aQ_{n-2}\right]\left[(2u+\sqrt{a})\,Q_{n-1} - aQ_{n-2}\right] \\ &= (2uQ_{n-1} - aQ_{n-2})^2 - aQ_{n-1}^2. \end{aligned}$$

D'autre part, la loi de formation des réduites nous donne la formule

$$2uQ_{n-1} - aQ_{n-2} = Q_n,$$

et, par suite, nous obtiendrons comme résultat final

$$Q_n^2 - aQ_{n-1}^2 = Q_{2n}. \tag{2}$$

Nous avons trouvé ce théorème par la transformation des déterminants exposée ci-dessus; mais on peut aussi parvenir à cette relation au moyen du calcul algébrique; car l'identité

$$\begin{aligned} &\sqrt{u^2-a}\left[(u+\sqrt{u^2-a})^{2n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+1}\right] \\ &= \sqrt{u^2-a}\left[(u+\sqrt{u^2-a})\,(u+\sqrt{u^2-a})^{2n}\right. \\ &\qquad \left. - (u-\sqrt{u^2-a})\,(u-\sqrt{u^2-a})^{2n}\right] \end{aligned}$$

donne immédiatement la suivante :

$$\begin{aligned} &2\sqrt{u^2-a}\left[(u+\sqrt{u^2-a})^{2n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+1}\right] \\ &= (u+\sqrt{u^2-a})^{2n+2} - 2a^{n+1} + (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+2} \\ &\quad - a\left[(u+\sqrt{u^2-a})^{2n} - 2a^n + (u-\sqrt{u^2-a})^{2n}\right]. \end{aligned}$$

La division par l'expression $4(u^2 - a)$ nous conduit à l'identité

$$\frac{(u+\sqrt{u^2-a})^{2n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+1}}{2\sqrt{u^2-a}} = \left[\frac{(u+\sqrt{u^2-a})^{n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{n+1}}{2\sqrt{u^2-a}}\right]^2 - a\left[\frac{(u+\sqrt{u^2-a})^{n} - (u-\sqrt{u^2-a})^{n}}{2\sqrt{u^2-a}}\right]^2,$$

ou encore, comme on le voit aisément [*],

$$Q_{2n} = Q_n^2 - aQ_{n-1}^2.$$

2. La comparaison de cette équation avec (1) nous montre qu'il faut poser

$$y = Q_n, \quad x = Q_{n-1}, \quad bz = Q_{2n}.$$

La valeur u jusqu'ici est inconnue, et il faudra maintenant résoudre en nombres entiers l'équation

$$Q_{2n} = bz. \tag{3}$$

Or on a, comme on a vu plus haut,

$$Q_{2n} = \frac{(u+\sqrt{u^2-a})^{2n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+1}}{2\sqrt{u^2-a}},$$

et, par conséquent, l'équation (3) se transforme comme il suit :

$$\frac{(u+\sqrt{u^2-a})^{2n+1} - (u-\sqrt{u^2-a})^{2n+1}}{2\sqrt{u^2-a}} = \dot{b}, \tag{4}$$

où $\dot{b}$ est le symbole connu introduit par Crelle pour désigner un nombre entier quelconque divisible par b. Le binôme nous conduit

---

[*] Comparez, au besoin, la Note élémentaire qui suit l'article de M. Günther.

enfin de l'équation (4) à la forme développée

$$(5)\quad \begin{cases} \binom{2n+1}{1}u^{2n} + \binom{2n+1}{3}u^{2n-2}(u^2-a) \\ \quad + \binom{2n+1}{5}u^{2n-4}(u^2-a)^2 + \ldots + \binom{2n+1}{2n+1}(u^2-a)^n = b, \end{cases}$$

$$\left[\binom{\nu}{\omega} = \frac{\nu(\nu-1)(\nu-2)\ldots(\nu-\omega+1)}{1.2.3\ldots\omega}\right].$$

On regardera comme inconnues, dans cette équation, les deux nombres u et n, et la discussion complète exigera la distinction de plusieurs cas séparés.

3. Soit d'abord a multiple de b, par exemple, $a = \mathrm{M}b$. Alors il suffira évidemment de faire $u = \mathrm{M}bu'$ (u' arbitraire) pour satisfaire à notre condition; d'où ce théorème :

I. *Pourvu que le coefficient de y^2 soit $= \mathrm{M}\times$ le coefficient de z (le module) et u' un nombre quelconque entier et positif, la congruence*

$$y^2 \equiv ax^2 \pmod{b}$$

a pour solution certains dénominateurs des réduites de la fraction continue

$$\cfrac{a}{2\mathrm{M}u' - \cfrac{a}{2\mathrm{M}u' - \ldots}},$$

car on trouvera, pour l'équation

$$y^2 - ax^2 = bz,$$

les valeurs

$$z = \frac{1}{b}\mathrm{Q}_{2n}, \quad y = \mathrm{Q}_n, \quad x = \mathrm{Q}_{n-1}.$$

u' et n représentent des nombres entiers et positifs quelconques; on a deux séries de ∞ valeurs satisfaisant à notre congruence.

Exemple. — Soit proposée l'équation

$$y^2 - 4x^2 = 2z, \quad a = 2.2, \quad b = 1.2, \quad \mathrm{M} = 2.$$

Si l'on pose $u' = 3$, il faut considérer la fraction continue

$$\cfrac{4}{12 - \cfrac{4}{12 - \ddots}},$$

d'où l'on déduit les valeurs ($n = 2$),

$$z = \tfrac{1}{2} Q_{2.2} = 9512, \quad y = Q_2 = 140, \quad x = Q_1 = 12.$$

On peut vérifier, en effet, l'identité

$$140^2 - 4 . 12^2 = 2 . 9512.$$

4. Tous les autres cas se ramènent à la résolution de la congruence quadratique

$$u^2 \equiv a \pmod{b}.$$

On sait que ce problème se trouve résolu dans les *Disquisitiones arithmeticæ* de Gauss, et nous pouvons donc le supposer connu; nous nous contentons de résumer cette solution comme il suit.

La congruence proposée possède des racines, si l'on peut regarder a comme résidu quadratique de b. Or soit

$$b = r^m s^n t^p, \quad \ldots,$$

où l'on entend par r, s, t, ... des nombres premiers quelconques (1 et 2 inclus); alors le nombre a est toujours résidu quadratique de b, si l'on a [*]

$$a \mathrm{R} r, \quad a \mathrm{R} s, \quad a \mathrm{R} t \ldots$$

Naturellement, il y a aussi des cas où la congruence ne possède pas une seule racine; si b, par exemple, est un nombre premier satisfaisant à la congruence

$$a^{\frac{b-1}{2}} \equiv -1 \pmod{b},$$

---

[*] La notation $a \mathrm{R} r$ signifie, dans Gauss, a résidu quadratique de r.

il est impossible de trouver un nombre tel que

$$u^2 - a = \dot{b}.$$

Mais, en général, nous supposerons qu'il existe k racines

$$u_1, u_2, u_3, \ldots, u_i, \ldots, u_k.$$

Nous prenons ici le mot *racine* dans le sens déterminé de Gauss; mais il est clair que chaque valeur

$$u_i \pm mb$$

satisfait également à la congruence $u^2 \equiv a \pmod{b}$.

5. Soit d'abord b impair $= 2c + 1$; alors on voit que toute expression de la forme (p arbitraire)

$$\left[\begin{matrix}(2p-1)(2c+1)\\ \rho\end{matrix}\right] [\rho < (2p-1)(2c+1)]$$

est divisible par b, et l'on arrive au théorème suivant :

II. *La congruence*

$$y^2 \equiv ax^2 \pmod{2c+1}$$

peut être résolue dès qu'on connaît le dénominateur d'une réduite d'indice

$$(2p-1)(2c+1) - 1 = \dot{2}$$

de la fraction continue

$$\cfrac{a}{2u_i - \cfrac{a}{2u_i - \ddots}} \quad [u_i^2 \equiv a \pmod{2c+1}].$$

On obtiendra, en effet,

$$z = \frac{1}{b} Q_{(2p-1)(2c+1)-1}, \qquad y = Q_{\frac{1}{2}[(2p-1)(2c+1)-1]}, \qquad x = Q_{\frac{1}{2}[(2p-1)(2c+1)-1]-1}.$$

Exemple. — Soit proposée l'équation

$$y^2 - 4x^2 = 5z = (2.2 + 1)z.$$

Comme $3^2 - 4 = 5$, on peut poser $u_1 = 3$, d'où l'on déduit la fraction continue

$$\cfrac{4}{6 - \cfrac{4}{6 - \ddots}}$$

En posant $p = 1$, nous trouvons

$$z = \tfrac{1}{5} Q_{5-1} = \tfrac{1}{5} Q_4 = 176, \quad y = Q_2 = 32, \quad x = Q_1 = 6.$$

On peut vérifier, en effet, que

$$32^2 - 4.6^2 = 5.176.$$

6. Supposons à présent b pair. Alors il faut distinguer deux cas spéciaux, selon que l'on aura b d'une des deux formes

$$2^{2m}(2c + 1) \quad \text{ou} \quad 2^{2m+1}(2c + 1),$$

où m et c sont des nombres entiers et positifs quelconques. Le cas

$$b = 2^{2m}(2c + 1)$$

est immédiatement réductible, puisque l'équation

$$y^2 - ax^2 = bz = 2^{2m}(2c + 1)z$$

se transforme de cette manière :

$$\left(\frac{y}{2^m}\right)^2 - a\left(\frac{x}{2^m}\right)^2 = (2c + 1)z,$$

ou, si l'on introduit les inconnues nouvelles y' et x',

$$y'^2 - ax'^2 = (2c + 1)z.$$

Exemple. — Si nous avons l'équation

$$y^2 - 7x^2 = 48z = 2^4(2.1 + 1)z,$$

nous la réduisons à la suivante :

$$y'^2 - 7x'^2 = 3z,$$

et, puisqu'on sait que 7 est une racine de la congruence

$$u^2 \equiv 7 \pmod 3,$$

on peut prendre la fraction continue

$$\cfrac{7}{14 - \cfrac{7}{14 - \ddots}}$$

La substitution $p = 2$ nous donne les solutions

$$z = \tfrac{1}{3} Q_8 = 378135891, \quad y' = Q_4 = 34349, \quad x' = Q_3 = 2548,$$

et nous pouvons vérifier l'identité

$$137396^2 - 7 \cdot 10192^2 = 48 \cdot 378135891.$$

L'étude du cas contraire, où

$$b = 2^{2m+1}(2c + 1),$$

conduit à un résultat partiellement négatif; car, en appliquant la même méthode de transformation, nous réduisons l'équation

$$y^2 - ax^2 = bz = 2^{2m+1}(2c + 1)z$$

à la forme plus simple

$$y'^2 - ax'^2 = 2(2c + 1)z,$$

et l'on voit sans aucune difficulté qu'il n'est pas toujours possible de résoudre cette équation par notre méthode; car, si nous considérons la formule (5), nous trouvons que le dernier terme $(u^2 - a)$ n'est divisible par b que dans ces deux cas :

$$\left.\begin{array}{ll} a \text{ impair}, & u \text{ impair} \\ a \text{ pair}, & u \text{ pair} \end{array}\right\} u^2 - a = \dot{2}.$$

Dans le premier cas, il n'y a pas de solution, parce que la somme

$$\binom{2n+1}{3} u^{2n-2}(u^2-a)^2 + \ldots + \binom{2n+1}{2n+1}(u^2-a)^n$$

est divisible par 2, mais non le premier terme $(2n+1)u^{2n}$, qui est toujours un nombre impair. Pour le deuxième cas, on peut se servir de la remarque suivante. Le nombre $u_i = 2u_i'$, comme on le suppose, est toujours pair. On fera donc

$$2n+1 = (2p-1)(2c+1), \quad [p \geqq 1],$$

et l'on obtiendra

$$(2n+1)u^{2n} = (2p-1)(2c+1)2^{2n}u_i'^{2n} = \left[\overline{2(2c+1)}\right].$$

Exemple. — Si nous avons l'équation

$$y^2 - 6x^2 = 10z = 2(2.2+1)z,$$

nous trouvons d'abord la racine $u_i = 2u_i' = 2.3$; prenons alors la fraction continue

$$\cfrac{6}{12 - \cfrac{6}{12 - \ddots}};$$

les dénominateurs des réduites nous donnent, pour $p = 1$, les valeurs

$$z = \frac{1}{10}Q_4 = 1818, \quad y = Q_2 = 138, \quad x = Q_1 = 12.$$

Voici la solution complète que l'on obtient ainsi :

$$138^2 - 6.12^2 = 18180;$$

et de plus deux autres relations équivalentes :

$$69^2 - 6.6^2 = 4545;$$
$$23^2 - 6.2^2 = 505.$$

Maintenant nous pouvons regarder comme finie la discussion de tous les cas possibles de la congruence proposée.

NOTE.

La valeur de Q_n et la formule fondamentale

$$Q_{2n} = Q_n^2 - a\,Q_{n-1}^2$$

peuvent s'établir d'une manière élémentaire, comme il suit. Posons

$$\sqrt{u^2 - a} = v, \quad u + v = s, \quad u - v = d,$$

ce qui donne

$$2u = s + d, \quad 2v = s - d, \quad a = u^2 - v^2 = ds.$$

On trouve immédiatement

$$Q_1 = 2u = s + d = \frac{s^2 - d^2}{s - d},$$

$$Q_2 = 4u^2 - a = s^2 + 2ds + d^2 - ds = \frac{s^3 - d^3}{s - d},$$

$$Q_3 = (4u^2 - a)\,2u - a.2u = \frac{s^4 - d^4}{s - d}.$$

Ces valeurs font pressentir que la loi est générale, ou que l'on a

$$Q_{n-2} = \frac{s^{n-1} - d^{n-1}}{s - d}, \quad Q_{n-1} = \frac{s^n - d^n}{s - d}, \quad \ldots.$$

En effet, on déduit de ces relations et de la formule

$$Q_n = 2u\,Q_{n-1} - a\,Q_{n-2}$$

la valeur

$$Q_n = \frac{(s + d)(s^n - d^n) - sd(s^{n-1} - d^{n-1})}{s - d} = \frac{s^{n+1} - d^{n+1}}{s - d}.$$

Une fois ce résultat obtenu, la vérification de la formule fondamentale se fait par un calcul très-simple, identique au fond à celui qui termine le n° 1 de l'article de M. Günther.

P. Mansion.