

SÉMINAIRE D'ANALYSE FONCTIONNELLE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Erratum

Séminaire d'analyse fonctionnelle (Polytechnique) (1980-1981), p. 0

http://www.numdam.org/item?id=SAF_1980-1981____A14_0

© Séminaire d'analyse fonctionnelle
(École Polytechnique), 1980-1981, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire d'analyse fonctionnelle implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/*

Séminaire d'Analyse Fonctionnelle 1980-1981

Exposé No II, G. Pisier, "Semi-groupes holomorphes et K-convexité"

E R R A T U M

Page 17, ligne 10,

lire : holomorphe sur $L_p^{(G, \lambda; X)}$.

Page 29, ligne 10,

lire : [9] T. Figiel et N. Tomczak-Jaegermann : Projections onto hilbertian subspaces of Banach spaces, Israel J. Math. 33 (1979) 155-171.

De plus, on a souvent omis de dire (dans le § 4) que X est supposé de dimension infinie.

Pour une application plus récente des résultats de l'exposé II nous renvoyons le lecteur à l'article "Quotients of Banach spaces of cotype q" à paraître dans les Proceedings de l'A.M.S.
