SÉMINAIRE DE PROBABILITÉS (STRASBOURG)

PIERRE VALLOIS

# Le problème de Skorokhod sur $\mathbb{R}$ : une approche avec le temps local

*Séminaire de probabilités (Strasbourg)*, tome 17 (1983), p. 227-239

<http://www.numdam.org/item?id=SPS_1983__17__227_0>

© Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1983, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire de probabilités (Strasbourg) (http://portail.mathdoc.fr/SemProba/) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

*Article numérisé dans le cadre du programme*
*Numérisation de documents anciens mathématiques*
http://www.numdam.org/

# LE PROBLEME DE SKOROKHOD SUR $\mathbb{R}$ :

# UNE APPROCHE AVEC LE TEMPS LOCAL

*Pierre VALLOIS*

## 1.- INTRODUCTION

$(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ désigne, dans tout ce travail, un mouvement brownien sur $\mathbb{R}$, issu de 0, $(L_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ son temps local en 0, $S_t \overset{\text{def}}{=} \sup_{s \le t} X_s$, et $\mu$ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. Lorsque $\mu$ vérifie $\int |x| \, d\mu(x) < +\infty$ et $\int x \, d\mu(x) = 0$, Azéma et Yor ont introduit ([1],[2]) le temps d'arrêt $T_\mu \overset{\text{def}}{=} \inf (t \mid S_t \ge \Psi_\mu(X_t)) = \inf \{t \mid \Phi_\mu(S_t) \ge X_t\}$, où $\Psi_\mu$ est la fonction "barycentre" de $\mu$ et $\Phi_\mu$ son inverse continue à droite, et ont montré que $X_{T_\mu}$ a pour loi $\mu$ ; si de plus $\int |x|^2 d\mu(x) < +\infty$, alors $E(T_\mu) = E(X^2_{T_\mu}) = \int x^2 d\mu(x)$.

Jeulin et Yor ([3]) ont étudié les temps d'arrêt $T^{h,k} \overset{\text{def}}{=} \inf \{t \mid X_t^+ h(L_t) + X_t^- k(L_t) = 1\}$, ce qui, compte tenu de l'équivalence en loi des processus $(S_t - X_t, S_t)$ et $(|X_t|, L_t)$ généralise l'étude faite par Azéma et Yor.

La construction d'Azéma-Yor est très asymétrique : les grandes valeurs de $(S_t)$ y jouent un rôle privilégié. L'objet de notre travail est de donner, dans le cadre de [3], une construction plus symétrique pour laquelle le résultat suivant sera vrai : lorsque $\mu(\{0\}) > 0$ , $S_T$ est intégrable si et seulement si :

$$\int_0^\infty \frac{\rho^-(x) - \rho^+(x)}{x} \, 1_{\{\rho^-(x) > \rho^+(x)\}} dx < +\infty, \text{ et } \int |x| \, d\mu(x) < +\infty \text{ (avec}$$

$$\rho^+(x) = \int_{[0,x]} t \, d\mu(t) \text{ et } \rho^-(x) = -\int_{]-x,0]} t \, d\mu(t), \; x > 0).$$

## 2.- RAPPELS DES RESULTATS DE L'ARTICLE DE JEULIN et YOR

a) Soient $h^+$ et $h^-$ deux fonctions boréliennes de $\mathbb{R}_+$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur $[0,\delta[$ et nulles sur $[\delta,+\infty[$, $0 \le \delta \le +\infty$ et vérifiant :

(2.1) $\forall\, x,\ 0 \le x < \delta,\ \int_0^x (\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-})(u)\, du < +\infty$ ,

(2.2) $\int_0^\infty (\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-})(u)\, du = +\infty$ (avec la convention $\frac{1}{0} = +\infty$).

On note $T_x \overset{\text{def}}{=} \inf\{t \mid L_t = x\}$ pour $x \ge 0$, et $T = T_\delta \wedge (\inf\{t > 0 ; X_t^+ = h^+(L_t)$ ou $X_t^- = h^-(L_t)\})$ (avec la convention $\inf(\emptyset) = +\infty$).

b) On peut donner une traduction géométrique de T :




[en pointillé : une trajectoire de $(X_t, L_t;\ t \le T)$]

c) La loi de $X_T$ est donnée :

$$(2.3)\quad E(f(X_T)) = f(0)\ \exp -\frac{1}{2}\int_0^\delta (\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-})(t)dt + \frac{1}{2}\int_0^\delta dx\ \{\frac{f(h^+(x))}{h^+(x)} + \frac{f(-h^-(x))}{h^-(x)}\}\ \exp -\frac{1}{2}\int_0^x (\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-})(u)du$$

pour toute fonction f borélienne, positive.

On dispose aussi de la loi du couple $(X_T, T)$ :

$$(2.4)\quad E[f(X_T)\ \exp -\frac{p^2}{2}T] = f(0)\ \exp -\frac{1}{2}\int_0^\delta p(\coth(ph^+(x)) + \coth(ph^-(x))dx + \frac{p}{2}\int_0^\delta dx[\{\frac{f(h^+(x))}{\mathrm{sh}(ph^+(x))} + \frac{f(-h(x))}{\mathrm{sh}(ph^-(x))}\}\ \exp -\frac{p}{2}\int_0^x (\coth(ph^+(s) + \coth(ph^-(s))ds]$$

pour toute fonction f borélienne positive et tout réel p.

## 3.- RESOLUTION DU PROBLEME DE SKOROKHOD

a) Soit $\mu^+$ la restriction de $\mu$ à $\mathbb{R}_+$. Si $X_T$ a pour loi $\mu$ et si l'on fait les hypothèses simplificatrices suivantes : $\mu(0) = 0$, $h^+$ continue à droite et strictement croissante, en notant $\tilde{h}^+$ l'inverse continue à droite de $h^+$ et en prenant f fonction borélienne de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, d'après (2.3), il existe $\phi : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ telle que : $\int f(x)\, d\mu^+(x) = \int \frac{f(h^+(x))}{h^+(x)}\, \phi(x)\, dx =$

$= \int \frac{f(x)}{x}\, \phi(\tilde{h}^+(x))\, d\tilde{h}^+(x)$ ; on en déduit que $\tilde{h}^+$ vérifie l'équation $d\tilde{h}^+(x) = \phi(\tilde{h}^+(x))\, d\left[\int_{[o,x]} t\, d\mu^+(t)\right]$, ce qui met en évidence $\tilde{h}^+$ (et non $h^+$) et suggère de poser $\tilde{h}^+(x) = F\left(\int_{[o,x]} t\, d\mu(t)\right)$.

NOTATIONS :

. $\rho^+(t) = \int_{[o,t]} u\, d\mu(u)$ ; $\rho^-(t) = -\int_{[-t,o]} u\, d\mu(u)$ ; $a_o = \rho^+(+\infty) \vee \rho^-(+\infty)$

. si f est une fonction croissante et continue à droite, on note $\tilde{f}$ son inverse continue à droite.

THEOREME 3.1 : Il existe $\delta$, $0 \le \delta \le +\infty$ et une fonction F définie sur $[0,+\infty]$ à valeurs dans $[0,+\infty]$, finie sur $[0,\delta[$, tels que si l'on pose $\tilde{h}^+ = \tilde{\rho}^+ \circ \tilde{F}$ et $h^- = \tilde{\rho}^- \circ \tilde{F}$ sur $[0,\delta[$, $h^+ = h^- \equiv 0$ sur $[\delta,+\infty[$ et $T \overset{\text{def}}{=} T_\delta \wedge (\inf\{t > 0 \mid X_t^+ = h^+(L_t)$ ou $X_t^- = h^-(L_t)\})$, alors $X_T$ a pour loi $\mu$.

Démonstration : On remarque que $\int_o^{\rho^+(\infty)} \frac{dt}{\tilde{\rho}^+(t)} = \mu(\mathbb{R}_+^*)$ et $\int_o^{\rho^-(\infty)} \frac{dt}{\tilde{\rho}^-(t)} = \mu(\mathbb{R}_-^*)$ ; on peut alors définir la fonction $\lambda$ :

$$(3.2) \qquad \begin{cases} \lambda(t) = 1 - \int_o^t \left(\frac{1}{\tilde{\rho}^+(s)} + \frac{1}{\tilde{\rho}^-(s)}\right) ds & \text{pour } 0 \le t < a_o \\ \lambda(t) = \mu(\{0\}) & \text{pour } a_o \le t < +\infty \end{cases}$$

$\lambda$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.

Notons F la fonction définie sur $[0,+\infty]$ dans $[0,+\infty]$ par :

$$F(x) = \begin{cases} \int_o^x \frac{2\, du}{\lambda(u)} & \text{pour } x \in [0,a_o[ \\ +\infty & \text{pour } x \in [a_o,+\infty] \text{ si } \mu(\{0\}) = 0 \\ \int_o^{a_o} \frac{2\, du}{\lambda(u)} < +\infty & \text{pour } x \in [a_o,+\infty] \text{ si } \mu(\{0\}) > 0 \end{cases}$$

F est croissante sur $[0,+\infty]$, strictement croissante, continue et dérivable sur $[0,a_o[$ .

On introduit les deux fonctions $H^+$ et $H^-$ définies par :

(3.3) $\quad H^+(x) = F(\rho^+(x))$ et $H^-(x) = F(\rho^-(x))$ pour tout x de $\mathbb{R}_+$.

Nous pouvons à présent définir les deux fonctions $h^+$ et $h^-$ :

(3.4) * si $\mu(\{0\}) = 0$, on note $h^+ = \widetilde{H}^+$ et $h^- = \widetilde{H}^-$, et on prend $\delta = +\infty$.

* si $\mu(\{0\}) > 0$, on pose $\delta = F(a_o) < +\infty$, $h^+ = \widetilde{H}^+$ et $h^- = \widetilde{H}^-$ sur $[0,\delta[$, et $h^+ = h^- \equiv 0$ sur $[\delta,+\infty[$.

Pour montrer que $X_T$ a pour loi $\mu$, nous procédons en quatre lemmes. Le premier permet de simplifier les expressions de $h^+$ et $h^-$ :

LEMME (3.5) : Pour tout x de $\mathbb{R}_+$, on a : $h^+(x) = \widetilde{\rho}^+(\widetilde{F}(x))$ et $h^-(x) = \widetilde{\rho}^-(\widetilde{F}(x))$

Démonstration : Il suffit bien sûr d'établir la première formule. Soit $x \in \mathbb{R}_+$.

1) si $x < H^+(+\infty) = F(\rho^+(\infty)) \leq F(a_o)$, alors $x < F(a_o)$, et donc $x = F(\widetilde{F}(x))$.
Mais, $h^+(x) = \widetilde{H}^+(x) = \inf\{t \mid H^+(t) > x\} = \inf\{t \mid F(\rho^+(t)) > F(\widetilde{F}(x))\} =$

$$= \inf\{t \mid \rho^+(t) > \widetilde{F}(x)\} ,$$

d'où $h^+(x) = \widetilde{\rho}^+(\widetilde{F}(x))$.

2) si $x \geq H^+(+\infty)$, alors $\widetilde{F}(x) \geq \rho^+(+\infty)$, et donc $\widetilde{\rho}^+(\widetilde{F}(x) = +\infty = \widetilde{H}^+(x) = h^+(x)$.

Le lemme (3.5) permet de montrer le résultat intermédiaire suivant :

LEMME (3.6) : Si x est un réel positif, $x < F(a_o)$, on pose
$\beta(x) = \int_o^x \left(\frac{1}{h^+(t)} + \frac{1}{h^-(t)}\right) dt$, alors $\beta(x) = -2 \log[\lambda(\widetilde{F}(x))]$ .

Grâce à ce résultat, les fonctions $h^+$ et $h^-$ vérifient les deux conditions (2.1) et (2.2) nécessaires pour la définition de T :

LEMME (3.7) : Pour tout x de $\mathbb{R}_+$, $x < \delta$, on a $\int_o^x \left(\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-}\right)(u)du < +\infty$ et
$\int_o^\infty \left(\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-}\right)(u)\, du = +\infty$ .

Enfin, on a le :

LEMME (3.8) : Si f est borélienne positive, on a $E(f(X_T)) = \int f(x)\, d\mu(x)$.

Démonstration : Notons $I_1 = \frac{1}{2}\int_o^\delta \frac{f(h^+(t))}{h^+(t)} \exp - \frac{\beta(t)}{2} dt$ et

$$I_2 = \frac{1}{2}\int_o^\delta \frac{f(-h^-(t))}{h^-(t)} \exp - \frac{\beta(t)}{2}\, dt$$

en utilisant successivement les lemmes (3.5), (3.6) et la définition de F :

$$I_1 = \frac{1}{2}\int_o^{\rho^+(\infty)} \frac{f(\tilde{\rho}(t))}{\tilde{\rho}(t)} \lambda(t)\, dF(t) = \int_o^{\rho^+(\infty)} \frac{f(\tilde{\rho}(t))}{\tilde{\rho}(t)}\, dt = \int_{]o,+\infty[} f(t)\, d\mu(t)$$

On obtient de même $I_2 = \int_{]-\infty,o[} f(t)\, d\mu(t)$, mais d'après (3.6), $\mu(\{0\})$ est donnée par $\mu(\{0\}) = \exp - \frac{1}{2}\int_o^\delta (\frac{1}{h^+} + \frac{1}{h^-})(t)dt$.

QUELQUES EXEMPLES

Exemple 1 : $\mu(dx) = \frac{1}{2\alpha} 1_{[-\alpha,\alpha]}(x)\, dx$, $\alpha > 0$ ; alors, $H^+(x) = H^-(x) = -x - \alpha\log(1 - \frac{x}{\alpha})$ (dans [1], les formules obtenues pour cette loi sont plus simples).

Exemple 2: $\mu(dx) = \alpha\delta_a + (1-\alpha)\,\delta_b$ ; $0 \le \alpha \le 1$, a et b réels, $a \le b$. On distingue :

1) a = b; alors, $T = \inf\{t \mid X_t = a\}$ ;

2) $0 \le a < b$ ; $0 < \alpha < 1$.

Si $0 < a < b$ et si $c = -2a \log(1-\alpha)$, alors sur $[0,T_c[$, $T = \inf\{t \mid X_t = a\}$ et sur $[T_c,+\infty[$, $T = \inf\{t \mid X_t = b\}$ .

Si $a = 0 < b$ et $c = -2b \log\alpha$, alors $T = \inf\{t \mid X_t = b\} \wedge T_c$.

3) $a \le 0 \le b$ ; $0 \le \alpha \le 1$

en notant $c = \begin{cases} \frac{2ab}{b-a} \log(\frac{\alpha a + (1-\alpha)b}{a}) & \text{si } \alpha a + (1-\alpha)b = \int x\, d\mu(x) \le 0 \\ \frac{2ab}{b-a} \log(\frac{\alpha a + (1-\alpha)b}{b}) & \text{si } \int x\, d\mu(x) \ge 0 . \end{cases}$

Si $\int x\, d\mu(x) \le 0$, alors, sur $[0,T_c[$, $T = \inf\{t \mid X_t = a \text{ ou } X_t = b\}$ et sur $[T_c,+\infty[$, $T = \inf\{t \mid X_t = a\}$ ; si $\int x\, d\mu(x) > 0$, il suffit de changer a en b et b en a.

Exemple 3 : $\mu(dx) = A[1_{\{x \ge a\}} \frac{dx}{x^2} + 1_{\{x \le -b\}} \frac{dx}{x^2}]$ avec $a > 0$, $b > 0$ et A réel vérifiant $A(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 1$. Alors

$$h^+(x) = a(1 + \frac{x}{2A}) \quad \text{et} \quad h^-(x) = b(1 + \frac{x}{2A}) .$$

Exemple 4 : $\mu(dx) = \frac{1}{a^2} \exp - \frac{2|x|}{a^2} dx$, alors $h^+(x) = h^-(x) = a\sqrt{x}$ .

## 4.- QUELQUES QUESTIONS D'INTEGRABILITE

Rappelons que $\mu$ est une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$, et T le temps d'arrêt défini par le théorème (3.1).

a) Uniforme intégrabilité de $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$

On se propose ici de donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $\mu$ pour que $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ soit uniformément intégrable. Lorsque la loi $\mu$ est symétrique et ne charge pas 0, la condition cherchée est très simple à établir ; nous obtenons :

PROPOSITION (4.1) : Si $\mu$ est une loi symétrique : $\forall\, x \in \mathbb{R}_+$, $\mu[0,x] = \mu[-x,0]$ et $\mu(\{0\}) = 0$; alors les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ appartient à $H^1$ ;

(ii) $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ est uniformément intégrable ;

(iii) $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$ .

Démonstration : Il suffit bien sûr de prouver iii) ⟹ ii). Mais si $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$, $\mu$ étant symétrique, on a $\rho^+(\infty) = \rho^-(\infty)$ et $h^+ = h^-$ ; de plus, $\mu(\{0\}) = 0$, donc $\forall\, s$, $s \le T$, $|X_s| \le h^+(L_s) \le h^+(L_T) = |X_T|$ ; $X_T$ admettant pour loi $\mu$ et $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$, alors i) est réalisé.

Si $\mu$ n'est pas symétrique, on procède par approximation ; d'après la définition de T, on a le :

LEMME (4.2) : Si $\mu$ est une mesure à support compact vérifiant $\int x\, d\mu(x) = 0$, alors $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ est une martingale bornée.

Remarque (4.3) Si $\mu$ vérifie $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$ et $\int x\, d\mu(x) = 0$, et $\mu$ n'est pas à support compact, par exemple sur $\mathbb{R}_+$, alors pour tout n de $\mathbb{N}$, il existe $\varepsilon_n$, réel positif tel que $\rho^-(\varepsilon_{n-}) \le \rho^+(n) \le \rho^-(\varepsilon_n)$.

Définissons à présent une suite de mesures $\mu_n$ qui approxime $\mu$ :

LEMME (4.4) : Soit $\mu$ vérifiant $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$ et $\int x\, d\mu(x) = 0$. Si $\mu$ est à support compact, on pose $\mu_n = \mu$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$, sinon on peut supposer par exemple que $\mu|_{\mathbb{R}_+}$ n'est pas à support compact. On définit $K_n^+$ et $K_n^-$ par :

$$K_n^+(x) = h^+(x) \quad \text{et} \quad K_n^-(x) = h^-(x) \quad \text{pour} \quad x \in [0, H^+(n-)[\ ,\ K_n^+(x) = K_n^-(x) = 0$$

pour $x \in [H^+(n-), +\infty[$ ; on note $\delta_n = H^+(n-)$ (les fonctions $h^+$, $h^-$, $H^+$ étant relatives à $\mu$). Alors :

1°. les fonctions $K_n^+$ et $K_n^-$ et le réel $\delta_n$ vérifient les conditions (2.1) et (2.2). On note $T_n$ le temps d'arrêt défini par $T_n = \inf(T, T_{\delta_n})$ (il est associé à $K_n^+$ et $K_n^-$) et $\mu_n$ la loi de $X_{T_n}$.

2°. $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite croissante de temps d'arrêt qui converge vers T.

3°. pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $\mu_n$ est à support compact et $\int x\, d\mu_n(x) = 0$.

Grâce au lemme précédent, on a, à l'aide du principe de démonstration du théorème (3.4) de [1] :

PROPOSITION (4.5) : La martingale $(X_{t \wedge T})_{t \in \mathbb{R}_+}$ est uniformément intégrable si et seulement si : $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$ et $\int x\, d\mu(x) = 0$.

PROPOSITION (4.6) : Si $\mu$ vérifie les conditions $\int |x|\, d\mu(x) < +\infty$ et $\int x\, d\mu(x) = 0$, alors $E(X_T^2) = E(T)$.

Démonstration : Il suffit en effet de remarquer que, si f est borélienne, $f(0) = 0$, on a : $E(f(X_{T_n})) = E(f(X_T) 1_{\{L_T < \delta_n\}})$ où $(T_n)$ est défini en (4.4), 1°), et donc : $\lim_{n \to +\infty} E(f(X_{T_n})) = \lim_{n \to +\infty} \int f(x)\, d\mu_n(x) = \int f(x)\, d\mu(x)$.

b) Appartenance de $(X_{t \wedge T})_{t \in \mathbb{R}_+}$ à $H^1$

Soit $S_t$ le processus défini par $S_t = \sup_{s \leq t} X_s$. Afin de mettre en évidence le caractère symétrique de notre étude, donnons une condition nécessaire et suffisante portant sur $\mu$ pour que $S_T$ soit intégrable :

PROPOSITION (4.7) : Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) $E(S_T) < +\infty$ ;

ii) $\begin{cases} E(X_T^-) \le E(X_T^+) \ \underline{\text{et}}\ E[(X_T^+ \log^+(X_T)] < +\infty \ \underline{\text{si}}\ \mu(\{0\}) > 0 \\ E(X_T^+) + \int_0^\infty [\frac{\rho^-(x) - \rho^+(x)}{x}] 1_{\{\rho^-(x) \le \rho^+(x)\}} dx < +\infty \ \ \underline{\text{si}}\ \ \mu(\{0\}) = 0. \end{cases}$

Démonstration : D'après [3], si $R \overset{\text{def}}{=} \sup\{s \mid s \le T,\ X_s = 0\}$, on remarque que : $S_T = X_T^+$ sur $\{X_T^+ > 0\}$, $S_T = S_R$ sur $\{X_T^+ < 0\}$ et $S_T = S_{T_\delta}$ sur $\{X_T^+ = 0\}$ et on peut alors expliciter la loi de $S_T$ :

$$(4.8)\quad E[f(S_T)] = \int_0^\infty f(x)\, d\mu(x) + \frac{1}{2}\int_0^\delta \frac{1}{h^-(u)} E\, f(S_{T_u}) 1_{\{T_u \le T\}}]du + E[f(S_{T_\delta}) 1_{\{T_\delta = T\}}],$$

pour toute fonction f borélienne de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.

Introduisons les notations suivantes :

$$(4.9)\quad \alpha(u,x) = P(S_{T_u} < x,\ T_u \le T) \quad \text{avec} \quad u \in \overline{\mathbb{R}}_+,\ u \le \delta\ ,\ x \in \mathbb{R}_+$$

$$g_1(x) = \frac{1}{2}\int_0^\delta \frac{1}{h^-(u)} [\lambda(\tilde{F}(u)) - \alpha(u,x)]\, dx$$

en appliquant la formule (4.8) avec $f = 1_{[x,+\infty[}$, puis le lemme (3.6), il vient :

$$(4.10)\quad P(S_T \ge x) = \mu[x,+\infty[ + g_1(x) + \mu(\{0\}) - \alpha(\delta,x)\ .$$

Remarque : Si $E(S_T) < +\infty$, alors $E(X_T^-) = \rho^-(\infty) \le E(X_T^+) = \rho^+(\infty) < +\infty$ , si $E(S_T) < +\infty$. Sachant que $X_t^+ - \frac{1}{2} L_t$ est une martingale locale continue, et que de plus : $X_t^+ \le S_T$ pour tout $t \in [0,T]$, et $E(S_T) < +\infty$, il vient, en localisant :

$$E(X_T^+) = \frac{1}{2} E(L_T) \le E(S_T) < +\infty\ .$$

Mais en raisonnant cette fois avec $X_t^- - \frac{1}{2} L_t$, en localisant à nouveau, et en appliquant le lemme de Fatou, on obtient : $E(X_T^-) \le \frac{1}{2} E(L_T) = E(X_T^+)$.

On supposera dans la suite de la démonstration $\rho^-(\infty) \le \rho^+(\infty) < +\infty$ .

Le lemme suivant nous donne l'expression de $\alpha(u,x)$ :

LEMME (4.11) : Pour tout u, $u \in \overline{\mathbb{R}}_+$ , $u \le \delta$ , et tout x de $\mathbb{R}_+$, on a :

$$\alpha(u,x) = P(S_{T_u} < x,\ T_u \le T) = \exp - \frac{1}{2}\int_0^u \left(\frac{1}{h^+(t) \wedge x} + \frac{1}{h^-(t)}\right) dt$$

Démonstration : Soit $u \in [0,\delta]$; notons $h_1^+(t) = h^+(t) \wedge x$ et $h_1^-(t) = h^-(t)$ pour $t < u$ et $h_1^+(t) = h_1^-(t) = 0$ pour $t \geq u$. (les fonctions $h^+$ et $h^-$ étant relatives à $\mu$). On introduit le temps d'arrêt $T_1' = \inf \{t \mid t \geq 0, X_t^+ = h_1^+(L_T)$ ou $X_t^- = h_1^-(L_T)\} \wedge T_u$. Alors, $\{S_{T_u} < x\} \cap \{T_u \leq T\} = \{X_{T_1'} = 0\}$. Il suffit maintenant d'appliquer la formule (4.1) de [3] et (4.9).

On constate que pour $u \in [0,H^+(x) \wedge H^-(x)[$, on a : $h^-(u) \leq x$, $h^+(u) \leq x$ et $\alpha(u,x) = \lambda(\tilde{F}(u))$ ; en utilisant le lemme (3.5), on peut modifier $g_1$ :

$$(4.12) \qquad g_1(x) = \int_{\rho^+(x)}^{a_o} \frac{1}{\tilde{\rho}^-(t)} (1 - \exp - b(t,x))\, dt, \qquad \text{avec}$$

$$b(t,x) = 1_{\{t \geq \rho^+(x)\}} \int_{\rho^+(x)}^{t} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\tilde{\rho}^+(s)}) \frac{ds}{\lambda(s)} \quad .$$

Remarque (4.13) : Puisque $\rho^-(\infty) \leq \rho^+(\infty) < +\infty$, $\int_{\rho^+(x)}^{a_o} \frac{1}{\tilde{\rho}^+(t)} dt = \mu[x,+\infty[$ et $\int_{\rho^-(x)}^{a_o} \frac{1}{\tilde{\rho}^-(t)} dt = \mu]-\infty,x]$ sont intégrables par rapport à $(1_{\mathbb{R}_+} dx)$ .

LEMME (4.14) : Soit $\phi$ la fonction définie par : $\phi(x) = \frac{a_o - \rho^+(x)}{x}$ si $\mu(\{0\}) > 0$, $\phi(x) = \frac{[\rho^-(x) - \rho^+(x)] \vee 0}{x}$ si $\mu(\{0\}) = 0$. Alors, il existe $c, 0 < c \leq \frac{1}{2}$, tel que pour tout $x$, $x \geq 1$ :

$$c\,\phi(x) - \frac{3}{2} P(|X_T| \geq x) \leq P(S_T \geq x) \leq \phi(x) + 2\, P(|X_T| \geq x)$$

Démonstration du lemme (4.14) : D'après (4.12), (4.13), et en notant $g_2(x) = \int_{\rho^+(x)}^{a_o} (\frac{1}{\tilde{\rho}^+(t)} + \frac{1}{\tilde{\rho}^-(t)})(1 - \exp - b(t,x))\, dt$, on a :

$$(4.15) \qquad g_2(x) - \mu[x,+\infty[ \leq g_1(x) \leq g_2(x) \quad .$$

En intégrant $g_2$ par parties avec $\lambda'(t) = -(\frac{1}{\tilde{\rho}^+(t)} + \frac{1}{\tilde{\rho}^-(t)})$ et en remarquant que $\lambda(a_o) \exp - b(a_o,x) = \alpha(\delta,x)$ et $\mu(\{0\}) = \lambda(a_o)$, il vient :

$$g_2(x) + \mu(\{0\}) - \alpha(\delta,x) = \int_{\rho^+(x)}^{a_o} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\tilde{\rho}^+(t)}) \exp - b(t,x)\, dt.$$

Si l'on utilise (4.10), (4.15) et (4.13), on obtient les inégalités :

(4.16) $\quad g_3(x) - \mu[x,+\infty[ \leq P(S_T \geq x) \leq g_3(x) + \mu[x,+\infty[$ , avec :

(4.17) $\quad g_3(x) = \frac{1}{x} \int_{\rho^+(x)}^{a_o} \exp - b(t,x)\, dt$ .

Nous distinguerons deux cas :

1°.- $\underline{\mu(\{0\}) > 0}$

Mais $\lambda(t) \geq \mu(\{0\})$ ; pour $x \geq 1$ et $t \geq \rho^+(x)$, il suffit alors de remarquer :

$$b(t,x) \leq \int_{\rho^+(x)}^{t} \frac{1}{x} \cdot \frac{ds}{\lambda(s)} \leq \frac{1}{x\mu(\{0\})} (t - \rho^+(x)) \leq \frac{a_o}{\mu(\{0\})} < +\infty$$

2°.- $\underline{\mu(\{0\}) = 0}$

Soit $t$, $t \geq \rho^+(x) \vee \rho^-(x)$, $\lambda_1(t) \overset{\text{def}}{=} \mu]-\infty,-x] + \int_t^{a_o} \frac{ds}{\tilde{\rho}^+(s)}$ , on a successivement : $\lambda(t) \leq \lambda_1(t)$ et $b(t,x) \geq \int_{\rho^+(x)\vee\rho^-(x)}^{t} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\tilde{\rho}^+(s)}) \frac{ds}{\lambda_1(s)}$ , on en déduit

$$\frac{1}{x} \int_{\rho^+(x)\vee\rho^-(x)}^{a_o} \exp - b(t,x)dt \leq \lambda_1(\rho^+(x)\vee\rho^-(x))[1 - \exp -\frac{1}{x} \int_{\rho^+(x)\vee\rho^-(x)}^{a_o} \frac{ds}{\lambda_1(s)}]$$

$$\leq \lambda_1(\rho^+(x) \vee \rho^-(x)) \ ;$$

en utilisant de plus la remarque (4.13), il vient :

(4.18) $\quad g_4(x) \leq g_3(x) \leq g_4(x) + \mu]-\infty,-x] + \mu[x,+\infty[$ , avec

(4.19) $\quad g_4(x) = 1_{\{\rho^+(x)<\rho^-(x)\}} \int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \exp - b(t,x)\, dt$ .

Mais la définition de $g_4$ prouve :

(4.20) $\quad g_4(x) \leq \frac{1}{x} 1_{\{\rho^+(x)<\rho^-(x)\}} (\rho^-(x) - \rho^+(x)) = \phi(x).$

Soit $t \in [\rho^+(x),\rho^-(x)]$, alors $\tilde{\rho}^-(t) \leq x$, $\lambda(t) \geq \lambda_2(t) \overset{\text{def}}{=} \lambda(\rho^-(x)) +$

$+ \int_t^{\rho^-(x)} (\frac{1}{x} + \frac{1}{\tilde{\rho}^+(s)})\, ds$ et $b(t,x) \leq \int_{\rho^+(x)}^{t} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\tilde{\rho}^+(t)}) \frac{dt}{\lambda_2(t)} = \frac{2}{x} \int_{\rho^+(x)}^{t} \frac{ds}{\lambda_2(s)}$

$- \log [\frac{\lambda_2(\rho^+(x))}{\lambda_2(t)}]$ ; en intégrant, on obtient :

$$(4.21)\quad \frac{1}{x}\int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \exp - b(t,x)dt \geq \frac{\lambda_2(\rho^+(x))}{2}\left(1-\exp -\frac{2}{x}\int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \frac{ds}{\lambda_2(s)}\right) .$$

$$\text{Mais } \log(\lambda_2(\rho^+(x))) - \log(\lambda_2(\rho^-(x))) - \frac{2}{x}\int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \frac{ds}{\lambda_2(s)} = \int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \left(\frac{1}{\tilde{\rho}^+(s)} - \frac{1}{x}\right) \frac{ds}{\lambda_2(s)} \leq 0,$$

donc :

$$(4.22)\quad \lambda_2(\rho^+(x))\exp-\left(\frac{2}{x}\int_{\rho^+(x)}^{\rho^-(x)} \frac{ds}{\lambda_2(s)}\right) \leq \lambda_2(\rho^-(x)) = \lambda(\rho^-(x)) \leq \mu[x,+\infty[ + \mu\,]-\infty,-x] .$$

En remarquant que $\lambda_2(\rho^+(x)) \geq \frac{1}{x}(\rho^-(x) - \rho^+(x)) = \phi(x)$, et en utilisant (4.22), (4.21) et (4.19), on montre $g_4(x) \geq \frac{1}{2}\,[\phi(x) - \mu(y \mid |y| \geq x)]$. Grâce à (4.18), (4.20) et (4.16), il vient :

$$\frac{1}{2}\,\phi(x) - \frac{3}{2}\,P(|X_T| \geq x) \leq P(S_T \geq x) \leq \phi(x) + 2\,P(|X_T| \geq x) \quad ,$$

ce qui achève les démonstrations du lemme (4.14), et de la proposition (4.7), en utilisant (4.14) et à nouveau (4.13).

L'énoncé suivant donne une caractérisation de l'appartenance à $H^1$ de $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ :

PROPOSITION (4.23) : La martingale $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ appartient à $H^1$ si et seulement si :

- $X_T$ appartient à L log L lorsque $P(X_T = 0) > 0$
- $E|X_T| + \int_0^\infty \frac{1}{x} \mid E[X_T, |X_T| \geq x] \mid dx < +\infty$ lorsque $P(X_T = 0) = 0$.

Remarque (4.24) : Lorsque $\mu(\{0\}) = 0$ et $\mu$ symétrique, en notant $X_T^* = \sup_{s\leq t} |X_s|$, on a l'égalité : $X_T^* = |X_T|$ ; il est ainsi clair que $(X_{t\wedge T})_{t\in \mathbb{R}_+}$ appartient à $H^1$ si et seulement si $\int |t|\, d\mu(t) < +\infty$.

## 5.- CALCUL DE LA LOI DU COUPLE $(X_T, T)$ .

Etudions d'abord le cas symétrique.

PROPOSITION (5.1) : Si $\mu$ est une mesure de probabilité symétrique ($\mu[0,x] = \mu[-x,0]$ $\forall\, x > 0$) sur $\mathbb{R}$, ne chargeant pas les points, on a :

$$E\,[f(X_T)\,\exp - \frac{p^2}{2}\,T] = \int_o^\infty \{(f(x) + f(-x))\,\frac{px}{sh(px)}\,\frac{1}{(1-2\mu[0,x])}$$

$$\exp - 2p \int_o^x \frac{u \coth pu}{1-2\mu[0,u]}\,d\mu(u)\}d\mu(x)\ ,$$

pour toute fonction f borélienne de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ et tout réel p, $p \neq 0$.

Pour l'étude du cas général, on utilisera le :

LEMME (5.2) : Si $f_1$ et $g_1$ sont deux fonctions boréliennes de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ que l'on prolonge à $\overline{\mathbb{R}}_+$ en posant $f_1(+\infty) = g_1(+\infty) = 0$, alors :

$$\int_o^{a_o} f_1(\tilde{\rho}^+(t))g_1(t)dt = \int_{\mathbb{R}_+^*} f_1(u)u\,g_1^+(u)\,d\mu(u) \quad \text{et}$$

$$\int_o^{a_o} f_1(\tilde{\rho}^-(t))g_1(t) = -\int_{\mathbb{R}_-^*} f_1(-u)u\,g_1^-(u)\,d\mu(u)$$

avec $g_1^+(t) = g_1(\rho^+(t))$ si $t \geq 0$ et $\mu(\{t\}) = 0$ ; $g_1^+(t) = \frac{1}{\Delta\rho^+(t)} \int_{\rho^+(t-)}^{\rho^+(t)} g_1(u)du$ si $t \geq 0$, $\mu(\{t\}) > 0$

$g_1^-(t) = g_1(\rho^-(-t))$ si $t \leq 0$ et $\mu(\{t\}) = 0$ ; $g_1^-(t) = \frac{1}{\Delta\rho^-(-t)} \int_{\rho^-((-t)-)}^{\rho^-(-t)} g_1(u)du$ si $t \leq 0$ et $\mu(\{t\}) > 0$ .

On peut alors énoncer le résultat général :

PROPOSITION (5.3) : Notons $a_p(x) = \frac{1}{\lambda(x)}\ \exp[-p\int_o^x \{\coth(p\tilde{\rho}^+(t)) +$

$+ \coth(p\tilde{\rho}^-(t))\}\,\frac{dt}{\lambda(t)}]$ où $p \in \mathbb{R}_+^*$, $0 \leq x$. Pour toute fonction borélienne positive de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$, et tout réel p non nul, on a :

$$E[f(X_T)\exp(-\frac{p^2}{2}T)] = f(0)\exp\,[-p\int_o^{a_o}\{\coth(p\tilde{\rho}^+(t)) + \coth(p\tilde{\rho}^-(t))\}\,\frac{dt}{\lambda(t)}] +$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^*} f(u)\,\frac{pu}{sh(pu)}\,\bar{a}_p(u)\,d\mu(u)$$

avec $\bar{a}_p(u) = a_p^+(u)$ si $u > 0$ et $\bar{a}_p(u) = a_p^-(u)$ si $u < 0$ et $\coth(p\infty) = 0$.

Dans le cas où $\mu$ est diffuse, on a le :

COROLLAIRE (5.4) : Si $\mu$ ne charge pas les points, on a :

$$E[f(X_T) \exp\left(-\frac{p^2}{2} T\right)] = \int_{\mathbb{R}} f(u) \frac{pu}{\operatorname{sh} pu} \bar{a}_p(u)\, d\mu(u) \quad ,$$

pour toute fonction f borélienne de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ et tout réel p, non nul, avec $\bar{a}_p(u) = a_p(\rho^+(u))$ si $u > 0$ et $\bar{a}_p(u) = a_p(\rho^-(-u))$ si $u < 0$, $a_p$ étant la fonction définie en (5.3).

---

## BIBLIOGRAPHIE


[1] J. AZEMA et M. YOR : Une solution simple au problème de Skorokhod. Séminaire de probabilités XIII, Lecture Notes in Math.,721 Springer(1979).

[2] J. AZEMA et M. YOR : Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent. Même référence.

[3] T. JEULIN et M. YOR : Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement brownien. Séminaire de probabilités XV, Lecture Notes, 850, Springer (1981).



*Pierre VALLOIS*

3, rue Victor Hugo

92700 COLOMBES.